

# Avertissements agricoles

## AVERTISSEMENT GRANDES CULTURES

destiné aux Agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès,  
rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture.

N° 2 C du 27/03/97

GRANDES CULTURES N° 2

<b>COLZA</b>	<b>Surveillez les Pucerons</b>
<b>POIS</b>	<b>Pas d'intervention cas général</b>
	Derniers semis attention aux Sitones
	Semis d'automne présence d'Anthracnose
<b>ORGE</b>	<b>Attention à la Rouille naine et à l'Oïdium</b>
<b>BLE</b>	<b>Pas d'intervention en général</b>
	Attention à l'Oïdium
	Recherchez la Rouille jaune

### COLZA

Des colonies de **Pucerons cendrés** sont toujours visibles pour l'instant sur les bordures de parcelles; les conditions à nouveau sèches et chaudes sont favorables à leur extension

Quelques **Charançons des Siliques** ont été capturés dans les cuvettes jaunes

Les **Meligèthes** sont toujours présents mais au stade actuel des colzas (F2 à G2) ils ne font plus de dégâts

Visez en priorité les Pucerons en intervenant lorsque 2 colonies par m<sup>2</sup> sont visibles en bordure; si vous constatez la présence de colonies à l'intérieur de la parcelle un traitement en plein est impératif

**BEST** 1.25 L/Ha

**KARATE K** 1 L

Le seuil d'intervention au stade G1-G2 pour les charançons est de 1 pour 2 plantes; un traitement de bordure peut suffire si vous les observez seulement dans cette zone

**DECIS Micro** 0.08 KG/Ha

**KARATE Xpress** 0.1 KG

### POIS

Les **Sitones** sont présents sur l'ensemble des cultures; suite à notre précédent bulletin celles-ci auraient dû être traitées  
Les derniers semis, stade 2-3 feuilles, sont sensibles et les dégâts (encoches sur le bord des folioles) sont visibles  
Les conditions sont à nouveau favorables au développement du ravageur et les cultures doivent être protégées

Les semis d'automne présentent des tâches caractéristiques de l'**Anthracnose** qui est favorisée également par les fortes humidités matinales et chaleur; sauf cas particulier il est préférable d'attendre le début floraison qui est proche pour réaliser une protection visant à encadrer cette période

**KARATE vert** 0.125 L/Ha

**DECIS CE** 0.25 L

**BAYTHROID** 0.3 L

**TALSTAR flo** 0.1 L

En cas de nécessité, maladie présente sur l'ensemble des plantes, vous pouvez intervenir avec

**CICERO** 2 L/Ha



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
ZAC D'ALCO B.P. 3056  
34034 MONTPELLIER CEDEX 01  
Tél.: 67.10.19.50 - Fax : 67.03.10.21

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON  
LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'inscription 531 AD  
ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.  
C.C.P. MONTPELLIER 5238-12 G

## ORGE

La plupart des parcelles sont maintenant aux stades 1-2 noeuds

La pression d'Oïdium est toujours très forte avec des conditions météo à nouveau favorables

La **Rouille naine** est également présente ainsi que l'**Helminthosporiose** mais à des niveaux encore faibles et peu présentes sur les feuilles supérieures  
La Rhynchosporiose est quasiment absente

## BLE

Les semis de Novembre arrivent au stade 1 noeud voire 2 noeuds dans les situations les plus précoces; les autres semis s'échelonnent du redressement à la fin tallage mais l'écart de stade se réduit entre les différentes dates

La plupart des maladies sont présentes sur les cultures mais n'atteignent que rarement des proportions inquiétantes

Les cultures sont marquées par une succession de stress depuis leur mise en place: excès d'eau puis sécheresse, mauvaise absorption d'azote, viroses, phytotoxicité de certains herbicides ....se manifestant par des jaunissements, des pointes de feuilles desséchées ou des tâches diverses sur les feuilles; il convient d'être prudent sur les diagnostics en particulier vis à vis de la Septoriose qui est quasiment absente ou de l'Oïdium dont la présence est marquée par des coussinets blanchâtres et non de simples jaunissements

**Maladies du pied:** après un hiver favorable ayant entraîné l'apparition du Piétin-Verse, la suite des conditions météo (sécheresse) ont stoppé sa progression

Par contre les racines de nombreuses cultures, surtout en conditions blé sur blé, manifestent des symptômes de brunissement provenant d'atteintes dues à des champignons du sol, difficiles à définir sans réelle détermination; il n'y a guère d'intervention à envisager, la lutte passe par des mesures agronomiques en particulier au niveau des rotations culturales

**Septoriose (tritici):** pas d'évolution; en régression avec la sécheresse

**Oïdium:** maladie la plus présente sur l'ensemble des cultures; attention aux parcelles traitées Réal la protection vis à vis de l'Oïdium arrive à son terme

La maladie est bien active et a tendance à gagner le haut de la plante; les conditions lui sont à nouveau favorables

**Rouille brune:** toujours présente mais reste localisée en général à la base des plantes et n'évolue pas

**Rouille jaune:** absente pour l'instant de notre zone (découverte toutefois sur du blé tendre Vito); nous vous rappelons de bien visiter vos parcelles en ne vous contentant pas des bordures; informez aussitôt votre technicien, conseiller ou nous-mêmes en cas de présence; cette maladie doit être stoppée dès son apparition

L'ensemble de ces maladies de l'orge est surtout visible sur les parcelles non traitées Réal, mais celles-ci arrivent en fin de protection surtout vis à vis de l'Oïdium

Surveillez l'ensemble de vos cultures (Réal ou pas)

Intervenez en zones sensibles et sur variétés sensibles au stade 1-2 noeuds en visant le complexe Oïdium - Rouille naine - Helminthosporiose avec

**OPUS 1 L/Ha**

**En général il n'y a pas d'intervention à réaliser pour l'instant sur les cultures de blé, d'autant que toutes les feuilles ne sont pas encore sorties**

Toutefois sur variétés sensibles et dans des zones favorables maintenant longtemps l'humidité matinale, si l'Oïdium gagne les étages supérieurs actuels, vous pouvez intervenir avec

**BOSCOR 1 L/Ha**

**CORBEL 1 L/Ha**

Si la Rouille brune est également bien présente, quelques pustules sur l'ensemble des feuilles sorties ou en présence de Rouille jaune préférez alors

**PAINDOR 0.33 L/Ha plus**  
**BOSCOR ou CORBEL 0.5 L**